

## Kannibalisme bij de geboorte

Nestverlies juist na het werpen om welke reden ook is zelfs voor de meest ervaren fokker een bron van ergernis of onmacht, aangezien kannibalisme honderd en één oorzaken kan hebben. Geen enkele fokker noch dierenarts kan bijgevolg juist bepalen waarom de voedster na de geboorte haar eigen jongen op eet. U vraagt zich misschien af of er dan helemaal niets tegen kannibalisme te doen valt. Toch wel, want naast een groot aantal minder bekende oorzaken en vermoedelijk slechts sporadisch optredende factoren, kunnen we de meest voorkomende oorzaken toeschrijven aan rustverstoring en voederfouten.

Nervositeit is in vele gevallen de oorzaak bij jonge voedsters die voor de eerste maal werpen. Het voortdurend, onbeheerst schoonlikken van de ijverige voedster kan leiden tot verwondingen bij het pasgeboren konijntje. Dit in combinatie met een gevoel van dorst zorgt er voor dat de voedster na het proeven van het eerste vocht en bloed haar werk met te grote ijver voorzet en het diertje tenslotte geheel of gedeeltelijk op eet. Dit rust beslist niet op een boosaardig karakter van de jonge voedster, maar wel op nervositeit. Als de jongen geboren worden, zitten ze achter elkaar in een soort worstvelletje. Het is de taak van de voedster de jongen hieruit te helpen door dit omhulsel ervan te eten. Tijdens deze bezigheid kan het gebeuren dat de voedster heel licht een oortopje of de beentjes bij één of meerdere jongen raakt, met verwonding tot gevolg. Bij controles zal u dan in het nest jongen ontdekken met één of beide oortjes aangevreten of met één of meerdere ledematen verminkt. Ook dit soort verwondingen ligt vaak aan het feit dat het de eerste maal is dat de voedster werpt. Herhaalt dit euvel zich bij een tweede of derde worp, dan is

het raadzaam dit dier voor verdere fok uit te sluiten. Hier is dan veelal sprake van een karakterfout van het dier.

Ook een gevoel van onveiligheid, vaak door gebrek aan rust of ruimte, kan leiden tot kannibalisme. Een dier dat zich onvoldoende beschermd voelt, doodt haar jongen uit een soort angstgevoel als reactie op onrust rond het hok bij de geboorte. Voor het werpen moeten we er dus vooral op letten dat we de natuurlijke omgeving van de voedsters niet verstoren en enkel de alledaagse handelingen uitvoeren, zodat het dier in alle rust haar jongen ter wereld kan brengen. Deze rust kan u uw dieren geven door ze een hok te geven met voldoende diepte (minimum 70 cm) of door het plaatsen van een nestkastje, zodat het dier zich voldoende kan afzonderen tijdens het werpen. Bedwing na het werpen uw nieuwsgierigheid en houdt de geboorte van op afstand in het oog. In normale omstandigheden hoeft de voedster geen hulp bij de geboorte.

Slechte of verkeerde voeding en vooral een groot tekort aan eiwitten kan ook dikwijls de oorzaak zijn van kannibalisme. Voor en tijdens de dracht is de voeding van de voedster belangrijker dan ooit. De goed uitgebalanceerde samengestelde konijnenkorrel bevat alles wat voor uw dier noodzakelijk is. Elk negatief verhaal over dit voeder kan u rustig naast u neerleggen. Goed gerst- of tarwestro, korrel en zuiver drinkwater zijn voldoende om uw voedsters gezonde jongen ter wereld te laten brengen. Sommige fokkers voegen aan hun korrelvoeder een enkelvoudig voeder toe, zoals maïsvlokken of geplette haver. Let wel op dat hierdoor de uitgebalanceerde samenstelling van uw krachtvoeder sterk kan wijzigen. Enkele dagen voor de geboorte iets extra

door *Gregoire De Swerdt*

serveren aan de voedster kan leiden tot darmstoornissen en in de ergste gevallen zelfs diarree. Ook het verstrekken van melk enkele dagen voor de verwachte geboortedatum – een van oudsher gekende traditie – is helemaal niet aan te raden.

Gebrek aan zouten tijdens de dracht kan ook weer leiden tot kannibalisme. Het strooien van een kleine hoeveelheid keukenzout (let op: enkel keukenzout, geen jodiumhoudend zout) over het krachtvoeder enkele dagen voor het werpen is in veel gevallen een probaat middel. Een tekort aan zouten in het lichaam is meestal een gevolg van een verkeerde voederwijze. Groenvoer met een hoog oxaalzuurgehalte zoals bietenblad, bloemkoolblad, spinazie en zuring, onttrekken zouten aan het lichaam van het moederdier.

Sommige onder ons, vooral de fokkers van dwerggrassen, maken naast enkele druppels azijn in het drinkwater wel eens gebruik van een ½ Aspro tablet of een kinder Aspro om de koorts bij het werpen te onderdrukken. Geeft dit bij uw voedsters de verwachte resultaten, waarom zou u dan deze handelswijze staken.

Veel succes met de fok.



Nestje jonge vlinders.